



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



**Ce document ne constitue pas une référence et n'est pas mis à jour, veuillez vérifiez les modalités de prescription médicamenteuse selon les dernière données de recherche médical selon les documents de référence.**

**Ce document est destiné aux médecins et aux professionnels de santé qui ont l'autorité de prescrire des médicaments seulement**

# **Ordonnances**

## **(Thérapeutique)**

- **Angine virale :**

1) Paracétamol : suppo 300mg \_\_\_\_\_ 01 boîte

01 suppo/6h jusqu'à disparition de la fièvre (sans dépasser 60mg/kg/jr)

2) SSI 0.9% en sol nasale

02 gouttes pour chaque narines/4-6h

- **Angine bactérienne :**

1) Benzathine benzylpénicilline : fl 600 000 UI \_\_\_\_\_ 01 flacon

01 inj en IM profonde en milieu hospitalier après avoir bien manger

2) Paracétamol : suppo 300mg \_\_\_\_\_ 01 boîte

01 suppo/6h jusqu'à disparition de la fièvre (sans dépasser 60mg/kg/jr)

- **Colique néphrétique :**

-Ordonnance d'urgence :

1) Phloroglucinol : amp 40mg

01 amp en IVL de 3-5minutes 1-3x/j

2) Ketoprofène : fl 100mg

100mg à dissoudre dans 100cc de SGI à perfuser en 20 min jusqu'à 03x/j si la douleur persiste

3) Paracétamol : fl 1g

1gr à dissoudre dans 100cc à perfuser en 15min, répéter au besoin au bout de 4h (sans dépasser 04gr/j)

-Ordonnance de sortie :

1) Phloroglucinol : cp 80mg \_\_\_\_\_ 01 boîte

02 cp 02x/j avec un verre d'eau jusqu'à disparition de la douleur (sans dépasser 5 jours)

2) Ketoprofène : gel 50mg \_\_\_\_\_ Qsp 05jr

01 gel 03x/j avec un verre d'eau au milieu des repas jusqu'à disparition de la douleur (sans dépasser 5 jours)

- **Colique hépatique :**

-Ordonnance d'urgence :

1) Phloroglucinol : amp 40mg

01 amp en IVL à renouveler si la douleur ne cède pas (sans dépasser 03 amp/jr)

2) Diclofénac : amp 75mg

01 amp/jr en IM

-Ordonnance de sortie :

1) Phloroglucinol : cp 80mg \_\_\_\_\_ 01 boîte

01cp 03x/jr jusqu'à disparition de la douleur (sans dépasser 06 cp/jr)

2) Diclofénac : cp 50mg \_\_\_\_\_ 01 boîte

01 cp 02x/jr matin et soir au milieu des repas (sans dépasser 03 cp /jr)

- **Crise d'asthme modérée :**

-Ordonnance d'urgence :

1) Salbutamol : nébulisation (05mg/2.5ml)

10mg en nébulisation 03x/h la première heure, puis 01x/h pendant 03 heures

2) Prédnisolone : cp 20 mg

01mg/kg/jr en une prise (sans dépasser 60mg/jr)

-Ordonnance de sortie :

1) Salbutamol : aérosol doseur 100µg/bouffée \_\_\_\_\_ 01 flacon

01 à 02 bouffées à la demande (sans dépasser 15 bouffées/jr)

2) Prédnisolone : cp 20 mg \_\_\_\_\_ Qsp 05jrs

01mg/kg/jr en une prise le matin avec un grand verre d'eau (sans dépasser 60mg/jr)

- **Pyélonéphrite :**

1) Cotrimoxazol : cp 480mg \_\_\_\_\_ Qsp 10jrs

02cp 02x/j pendant 10 jours

2) Paracetamol : cp 1g \_\_\_\_\_ 01 boîte

01cp 03x/jrs espacés de 6h

- **Diabète type 2 :**

1) Métformine : cp 500mg \_\_\_\_\_ Qsp 01 mois

01cp 02x/j au milieu des repas pdt 01 mois (sans dépasser 06cp /j)

-Ou (si BMI inférieur à 28 kg/m<sup>2</sup>)

1) Glimépiride : cp 01mg \_\_\_\_\_ Qsp 01 mois

01cp/jr

- **Entorse de la cheville bénigne :**

1) Paracétamol : cp 1gr \_\_\_\_\_ 01 boîte

01cp 03x/jr toute les 6h (sans dépasser 04 cp/jr)

2) Diclofénac : cp 50mg \_\_\_\_\_ Qsp 05jrs

01cp 02x/jr au milieu des repas pdt 05 jrs

- **HTA essentielle :**

1) hydrochlorothiazide : cp 25mg \_\_\_\_\_ Qsp 03 mois

01 cp/j le matin à heure fixe avec un grand verre d'eau pdt 03 mois

- **Sciatique commune :**

1) Diclofénac : cp 50mg \_\_\_\_\_ Qsp 05jrs

01 cp 02x/jr au milieu des repas (sans dépasser 03 cp/jr) pdt 05 jrs

- **Reflux gastro-oesophagien :**

1) Oméprazole : gel 20mg \_\_\_\_\_ Qsp 01 mois

01 gel/j le soir pdt 01 mois

2) Domperidone : cp 10mg \_\_\_\_\_ Qsp 01 mois

1cp 03x/j avant les repas pdt 01 mois

- **Ulcère gastro-duodéal :**

1) Oméprazole : gel 20mg \_\_\_\_\_ Qsp 01 mois

01gel 02x/jour avant les repas pdt 01 semaine, puis 1gel/jour avant le petit déjeuner pendant 03 semaines

2) Amoxicilline : cp 1gr \_\_\_\_\_ Qsp 07jrs

01cp 02x/jr pdt 07 jrs

3) Clarithromycine : cp 500mg \_\_\_\_\_ Qsp 07jrs

01cp 02x/jr pdt 07 jrs

- **Diarrhée aiguë amibienne**

1) Métronidazole : cp 500mg \_\_\_\_\_ Qsp 10jrs